


## BỆNH DỊCH TẢ LỢN CỎ ĐIỂN VÀ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH



Chi cục Chăn nuôi và Thú y  
Địa chỉ: Đường Tôn Đức Thắng, Khu phố  
Tân Trà, phường Tân Bình, thành phố  
Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.  
☎ 02713880171  
email: chieucuenty.snnptnt@binhphuoc.gov.vn  
pnv.snnptnt@binhphuoc.gov.vn

### 1. Bệnh Dịch tả lợn cổ điển (DTLCĐ) là gì?

- ✓ Là bệnh truyền nhiễm của loài lợn, gây ra bởi một loại vi rút có cấu trúc ARN thuộc giống *Pestis* vi rút, họ *Flaviridae*
- ✓ Bệnh chỉ xảy ra ở loài lợn (kể cả lợn nhà và lợn rừng) với các thể cấp tính, á cấp tính, mạn tính hoặc dạng không điển hình.
- ✓ Bệnh Dịch tả lợn có tốc độ lây lan rất nhanh và tỷ lệ chết đến 90% và thường ghép với bệnh khác như bệnh Phó thương hàn, Tụ huyết trùng, Đóng dấu lợn, bệnh do *Mycoplasma*.

### 2. Sức đề kháng của vi rút

- ✓ Vi rút Dịch tả lợn có sức đề kháng yếu, có khả năng tồn tại lâu ở ngoài môi trường. Trong phân gia súc vi rút có thể sống sót trong vài ngày, vi rút có thể sống vài tháng đến vài năm trong thịt đông lạnh.
- ✓ Vi rút dễ bị tiêu diệt ở nhiệt độ cao và các chất sát trùng thông thường như xút (NaOH) 2%, nước vôi 5%,...

### 3. Nguồn bệnh và đường truyền lây

- ✓ **Loài mắc:** Lợn mọi lứa tuổi, đặc biệt là lợn con 2-3 tháng tuổi;
- ✓ **Nguồn bệnh:**
  - Các chất bài tiết, dịch tiết, máu, hạch lâm ba, lách lợn mắc bệnh có chứa vi rút.
  - Lợn khỏi bệnh sau 2 tháng vẫn bài thải mầm bệnh ra ngoài môi trường;



### Đường truyền lây bệnh DTLCĐ

Lây trực tiếp: qua tiếp xúc giữa lợn lợn khỏe và lợn khỏe

Lây gián tiếp: qua các chất bài tiết, qua thức ăn, nước uống, dụng cụ chăn nuôi, phương tiện vận chuyển hay do các động vật khác có mang mầm bệnh.

# 1. Các dấu hiệu bệnh DTLCD

## Triệu chứng lâm sàng

### Thể quá cấp tính:

Bệnh phát hiện đột ngột, nông có triệu chứng an đầu, lợn ủ rũ, sốt cao trên 41°C, chết nhanh trong vòng 24-36 giờ; tỷ lệ chết có thể lên tới 100%.

### Thể cấp tính:

Lợn ủ rũ, biếng ăn hoặc bỏ ăn, sốt cao kéo dài đến lúc gần chết, mắt viêm đỏ có dử, chảy nước mũi, miệng có loét phủ bựa vàng ở lợi, chân răng, hầu; lợn nôn mửa, thờ khờ, nhịp thở rối loạn. Lúc đầu táo bón sau đó tiêu chảy, phân có mùi thối khắm và có thể lẫn máu tươi. Trên da có nhiều điểm xuất huyết làm tím ở tai, mõm, bụng và 04 chân. Vào cuối kỳ bệnh, lợn bị bại 2 chân sau, đi loạng choạng hoặc không đi được. Nếu ghép với các bệnh khác thì có triệu chứng trầm trọng hơn

### Thể mạn tính:

Lợn tiêu chảy, gầy yếu, chết do kiệt sức; lợn khờ bệnh có thể mang vi rút.

## Một số hình ảnh bệnh DTLCD



Xuất huyết dưới biểu mô lan rộng



Viêm kết mạc, vàng da



Tim chóp tai



Nhồi huyết ở rìa lách



Các vết loét hình cúc áo trên niêm mạc ruột già

## 5. Các biện pháp phòng, chống bệnh

✓ Áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; thường xuyên vệ sinh, sát trùng khu vực chăn nuôi bằng hóa chất, vôi bột.



Khử trùng phương tiện ra/vào cơ sở chăn nuôi



Khử trùng chuồng trại

✓ Xây dựng, duy trì cơ sở chăn nuôi lợn an toàn dịch bệnh đối với bệnh Dịch tả lợn cổ điển theo quy định.

✓ Lợn giống phải có nguồn gốc rõ ràng, tin cậy, đã được tiêm vắc xin DTLCD; xuất phát từ cơ sở an toàn dịch bệnh.

✓ Tiêm phòng bắt buộc bệnh DTLCD cho đàn lợn. Chủ động tiêm vắc xin DTLCD theo quy trình nuôi và định kỳ tiêm phòng bổ sung cho đàn lợn nuôi mới, đàn lợn hết thời gian còn miễn dịch bảo hộ theo hướng dẫn của nhà sản xuất và cơ quan thú y



Hình ảnh tiêm phòng cho đàn lợn

✓ Thường xuyên, liên tục giám sát lâm sàng trên đàn lợn.

✓ Khi có biểu hiện bệnh, chết bất thường, nghi mắc bệnh DTLCD nhanh chóng báo cáo ngay cho cơ quan thú y gần nhất và chính quyền địa phương để kịp thời xử lý theo quy định.

Giấy phép số: 27/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Phước cấp ngày 21/12/2023. In 1.100 tờ, khổ 21 x 29,7 cm tại Cơ sở Minh Quân Bình Phước - ĐC: số 1095 Phú Riềng Đỏ, P. Tân Bình, TP. Đồng Xoài, T. Bình Phước. In xong và nộp lưu chiểu tháng 12/2023.

Xuất bản phẩm không kinh doanh.